

No olvide:

- Darle la medicina a la misma hora todos los días.
- Haga que su hijo tome la medicina antes de las comidas o antes de ir a dormir.
- Marcar en el calendario cada vez que su hijo tome las medicinas.
- Mantener el medicamento en un lugar donde pueda verlo, pero fuera del alcance de los niños.

¿Qué debo hacer si me olvido de darle el medicamento a mi hijo?

- Dele a su hijo la próxima pastilla según se ha programado.
- Haga una marca o raya en el frasco por cada dosis que olvide.
- Traiga el frasco del medicamento marcado o las pastillas que hayan sobrado a la próxima visita con el médico.
- Dígaselo al médico o la enfermera en su próxima visita.
- NO le de pastillas adicionales para compensar por las que se haya olvidado.

Llame a la clínica . . .

- Si su hijo tiene algún problema con el medicamento.
- Mantenga las citas en la clínica para que su médico pueda asegurarse de que el medicamento está funcionando.
- Si tiene alguna pregunta, llame a la clínica y pida hablar con una enfermera.

Puntos importantes a recordar:

- El medicamento es muy seguro para los niños.
- Tomar un medicamento para la infección tuberculosa es la única forma de matar los microbios de la tuberculosis y prevenir que su hijo se enferme de tuberculosis.
- Su hijo no necesita otra prueba cutánea de tuberculosis.
- Conserve la carta o tarjeta que reciba cuando su hijo complete el tratamiento.

Nombre de su médico/enfermera:

Citas en la clínica:

Preguntas para el médico/enfermera

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Recuerde: La tuberculosis puede prevenirse, tratarse y curarse

Nombre de su clínica: _____

Dirección: _____

N.º de teléfono: _____

Lo que deben saber los padres sobre la infección de la tuberculosis en los niños



NEW JERSEY
MEDICAL SCHOOL
**GLOBAL
TUBERCULOSIS
INSTITUTE**

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis o TB es una enfermedad que, en la mayoría de los casos, afecta los pulmones. La tuberculosis se transmite de una persona a otra por el aire cuando alguien que está enfermo de tuberculosis tose, se ríe o canta.

¿Cual es la diferencia entre la infección tuberculosa y la enfermedad de la tuberculosis?

Infección por tuberculosis

Si una persona respira aire que tiene microbios de tuberculosis, puede contraer infección tuberculosa. Esto significa que sólo tiene microbios de tuberculosis latentes (inactivos) en el cuerpo y que los microbios no están haciendo que esa persona se enferme. Estas personas no pueden pasar estos microbios a nadie.

Enfermedad de la tuberculosis

La enfermedad de la tuberculosis se desarrolla a partir de una infección tuberculosa; si los microbios latentes del cuerpo se despiertan y comienzan a crecer, la persona se enfermará de tuberculosis. **Los niños con infección por tuberculosis pueden enfermarse muy rápido de tuberculosis si no reciben tratamiento.**

¿Cómo sé si mi hijo tiene infección por tuberculosis?

Si la prueba cutánea de tuberculina en el brazo es positiva, es probable que el niño tenga infección tuberculosa. El médico examinará a su hijo, y es posible que ordene una radiografía del pecho u otras pruebas para asegurarse de que no tiene la enfermedad de la tuberculosis.

¿Cual es el tratamiento para la infección tuberculosa?

La infección tuberculosa se trata normalmente con un medicamento llamado isoniazida o INH durante 9 meses. El INH mata los microbios de tuberculosis en el cuerpo. Los medicamentos impedirán que su hijo se enferme con la enfermedad de la tuberculosis. El INH es seguro para los niños. Aunque el INH está disponible en líquido, a algunos niños no les gusta el sabor, o es posible que les produzca diarrea, así que generalmente se administra en pastillas. Cuando su hijo complete el tratamiento, recibirá una carta o una tarjeta tamaño billetera para que la conserve en sus archivos. Esto será de utilidad en caso de que a su hijo se le pida que se realice otra prueba cutánea de tuberculosis en el futuro.



¿Por qué debería tratar la infección tuberculosa de mi hijo?

- El medicamento impide que se desarrolle la enfermedad de la tuberculosis.
- **La tuberculosis puede provocar una enfermedad que puede poner en riesgo la vida y producir la muerte de los niños.**
- Los niños tienen más riesgos de contraer la enfermedad de la tuberculosis que los adultos.
- Es muy probable que los niños contraigan la enfermedad de la tuberculosis poco después de infectarse con el microbio de la tuberculosis.

¿Cómo le puedo dar las pastillas a mi hijo?



Las pastillas pueden triturarse para dárselo a los bebés y a los niños pequeños.



Las pastillas trituradas pueden disolverse en una cucharadita de agua. Esto se puede poner en el tetero para darle a su bebé.

Además, estas pueden mezclarse con una pequeña cantidad de comida, como puré de manzana, bananas trituradas, yogur o pudín.

¿Puede provocar algún problema este medicamento?

Aunque se considera que el medicamento que se usa para tratar la infección por tuberculosis en los niños es muy seguro, todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Suspenda la administración del medicamento y llame a la clínica inmediatamente si su hijo tiene alguno de estos síntomas:

- Dolor estomacal
- Escaso o ningún apetito
- Sarpullido
- Pérdida de energía
- La parte blanca del ojo se torna amarilla